

Masuri pentru prevenirea transmiterii interumane a germenilor rezistenti

- Identificarea zonelor unde se poate realiza izolarea/gruparea pacienților care prezinta suspiciune /confirmare germene rezistent
- Dotarea cu echipamente de unică folosință sau cu unele care pot fi corect decontaminate
- Optimizarea procedurilor pentru montarea și îngrijirea cateterelor
- Aplicarea măsurilor de igienă a mâinilor cu apă și săpun,dezinfectat
- Precauțiuni de contact față de pacienții infectați/colonizați cu germeni rezistenti, dar și față de pacienții cu risc major de a fi colonizați (până la obținerea rezultatului testării)

Se va avea în vedere următoarea succesiune corectă a evenimentelor:

- spălarea mâinilor
 - purtarea corecta a echipamentelor de protectie complet MASCA ,manusi,halate,inainte de intrare in contact cu pacientii ,in salon
 - intrarea în salonul pacientului/pacienților infectați(i)/colonizați(i)
 - îngrijirea pacientului/pacienților
 - debarasarea de halate și mănuși
 - spălarea mâinilor și dezinfectia ,apoi ieșirea din salonul respectiv
-
- Curățenie riguroasa și dezinfecție curenta si terminala,conform procedurilor, cu respectarea graficelor si ori de cate ori este necesar
 - Gruparea pacienților colonizați/infectați și personal dedicat lor
 - Testarea tuturor contactilor cazului index și cazurilor secundare și izolarea imediată a purtătorului/pacientului infectat

- De luat în calcul testarea săptămânală și la externare a tuturor pacienților din secțiile cu cazuri identificate în funcție de etiologia germenilor

-Raportarea cazurilor de IAAM identificate imediat la SPIAAM

Nu se recomandă testarea de rutină a personalului r,dar pentru a exclude eventuala contaminare a acestuia se poate indica in cazuri de fata.