

CALENDARUL NAȚIONAL DE VACCINARE

VÂRSTA RECOMANDATĂ	TIPUL DE VACCINARE	UNDE SE FACE VACCINAREA
Primele 24 de ore 2-7 ore	Vaccin hepatitic B (Hep B)* ¹ Vaccin de tip Calmette Guérin (BCG)	În maternitate
2 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat* ²	Medic de familie
4 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat* ²	Medic de familie
11 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat* ²	Medic de familie
12 luni	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	Medic de familie
5 ani	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	Medic de familie
6 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)	Medic de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (DTPa)	Medic de familie

*1 În situația în care vaccinul hepatic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

VÂRSTA RECOMANDATĂ	TIPUL DE VACCINARE	UNDE SE FACE VACCINAREA
6 săptămâni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) DOZA I	Medic de familie
30 de zile de la prima doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) DOZA II	Medic de familie
30 de zile de la a doua doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) DOZA III	Medic de familie

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B – hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).

Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatic B care nu a fost administrată la naștere.

*² Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul național de vaccinare în funcție de fondurile disponibile.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.

